

**服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。**

小児用かぜ内服薬

小児用 ジキニン[®] シロップ**第2類医薬品**

販売名: 小児用ジキニンシロップ

小児用ジキニンシロップは、5つの成分を配合したお子さまのための総合感冒内服液です。

【使用上の注意】

*本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないでください。**5. 長期連用しないでください。****相談すること****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人は。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| * 薬剤性過敏症症候群 | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

[表面からのつづき]

| | |
|-----------------|---|
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切がする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かぜの諸症状（せき、発熱、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

次の1回量を（添付の計量カップではかり）食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-------|---------|----------------------|
| 3才以上 | 7才未満 | 5 mL 3 mL 2 mL |
| 6ヵ月以上 | 3才未満 | |
| 3ヵ月以上 | 6ヵ月未満 | |
| 3ヵ月未満 | 服用しないこと | |

必要な場合には就寝前の服用も加えて1日6回まで服用できますが、このような場合には約4時間の間隔をおいてください。

【用法・用量に関する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成 分】 (30mL中)

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20 mg 無水カフェイン……………25 mg
 アセトアミノフェン……………300 mg カンゾウ（甘草）エキス……………332 mg (原生葉換算量1,660 mg)
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.5 mg
 添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、白糖を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- 開栓後は、長期保存しないでください。

=安全キャップについて=

本品には、薬量を計る計量カップ（透明）と、お子さまの誤飲を防ぐための安全キャップ（茶色）とが、透明なフィルムに包まれて添付されています。ご使用に際しては、この安全キャップをご利用ください。（この安全キャップを取付けては、お子さまにはキャップが簡単にあけられないようになります。）

ご使用の際には、透明のフィルムをはがし、安全キャップをとり出したのち、下記手順にしたがって取付けてください。

〔取付け方〕

安全キャップ（茶色）を容器の白いキャップの上にかぶせ、右図のようにバチンと音がするまで手のひらで上から強く押し、取付けます。この状態では、安全キャップはから回りします。

◎いったん安全キャップを取付けたら、取りはずさないでください。



【あけ方】
 右図①の如くキャップを上から押しながら②の矢印の方向に回し、あけてください。

【しめ方】
 普通のキャップをしめる要領で回し、から回りし始めたら、右図①の如くキャップを上から押しながら③の矢印の方向に回し、しっかりとしめてください。その後、上から押さず、②の矢印の方向に回し、から回りしてキャップがあかないことを確かめてください。



問い合わせ先

- お買い求めのお店
- 全薬工業お客様相談室
 住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
 電 話：03（3946）3610
 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15