


服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



胃に留まる脂などによる消化不良に効く

大正胃腸薬バランスー

第2類医薬品

(消化酵素配合胃腸薬)

販売名:大正胃腸薬バランスー

- ◆大正胃腸薬バランスーは、消化酵素が消化を助け、健胃生薬が胃腸機能を調節し、胃に留まる脂などによる消化不良・胃もたれを改善します。
- ◆清涼感のあるスーっとした服用感です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
- 2 長期連用しないでください



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の診断を受けた人。
腎臓病

- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

- 4 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



効 能






消化不良、消化促進、胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、食欲不振(食欲減退)、胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ、胃部・腹部膨満感、胃重、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、胸つかえ、嘔吐、胃弱



用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

次の量を食間又は食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	成人(15才以上)	11才~14才	8才~10才	5才~7才	3才~4才	3才未満
1回量	1包 	2/3包 	1/2包 	1/3包 	1/4包 	服用しないこと
服用回数	1日 3回					

- [注意] (1)定められた用法・用量を厳守してください。
 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

食間の服用は、食事の後 2～3 時間を目安にします

成 分


1包(1.2g)中

	成 分	分 量	はたらき
消化酵素	ピオチアスターゼ2000	30mg	でんぷんとたんぱく質の消化を助けます。
	プロザイム 6	6.7mg(3包中20mg)	たんぱく質の消化を助けます。
	リパーゼAP 6	30mg	脂肪の消化を助けます。
健胃生薬	ケイヒ末	133.3mg(3包中400mg)	5つの健胃生薬が弱った胃腸機能を改善して、胃の動きを活発にします。
	ショウキョウ末	15mg	
	ソウジュツ末	15mg	
	コウボク末	15mg	
	チンピ末	15mg	
制酸剤	合成ヒドロタルサイト	300mg	胃酸を中和して、消化酵素の動きをサポートします。
	炭酸水素ナトリウム	150mg	

添加物：D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントール、香料、プロピレングリコール、カルメロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ポリソルベート80、タルク、二酸化ケイ素


保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



治療のポイント

本剤を服用されるほか、日常生活においても次の点にご注意ください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 **大正製薬株式会社 お客様119番室**

電 話 **03-3985-1800**

受付時間 **8:30~21:00(土、日、祝日を除く)**

発売元
大正製薬株式会社
 東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元
株式会社パナケイア製薬
 富山県高岡市中田4576番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)