



第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬

乾燥した瞳にうるおいを
ドライアイに

アールCL

ノアールCLは…

- コンタクトレンズ（ソフト、ハード、O₂、使い捨て）をつけたまま点眼できます。
- 涙に近い性質で、目にやさしい目薬です。
- 涙液を補助して目の疲れや目のかわきなどに効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

【効 能】

目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1日3～6回、1回1～3滴点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕15mL中

成分	分量	働き
塩化ナトリウム	105mg	涙液の補助として目の機能を正常に保ち、目の疲れ、目のかわきに効果をあらわします。
塩化カリウム	14.25mg	

添加物として、亜塩素酸Na、ホウ酸、pH調節剤を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中（ダッシュボード等）や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 **03-5412-7393**
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号