



2013年2月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類
医薬品**ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。**点眼薬**

結膜充血・目の疲れに

**ノアール[®]N
アルファ**

ナファゾリン塩酸塩配合

ノアール N アルファは…

- ナファゾリン塩酸塩が結膜充血に効果をあらわします。
- 目の疲れに効果をあらわすシアノコバラミン、ピリドキシン塩酸塩、タウリンを配合しています。
- さしごちのよいピンク色の目薬です。

**使用上の注意****相談すること****1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。


キャップの開閉方法

必ずキャップを上にして容器の角を持って開けてください。


●開け方

キャップを手前にひねってください。

(容器の中心を押さえたまま開けると薬液がとびだすことがあります。)

**●閉め方**

カチッと音がするまで押し下げてください。



〔効 能〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴 点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕15mL中

成 分	分 量	働 き
ナファゾリン塩酸塩	0.45mg	結膜充血を改善します。
グリチルリチン酸 二カリウム	7.5mg	結膜充血、紫外線などによる目の炎症、まぶたのただれに効果をあらわします。
シアノコバラミン	0.6mg	視神経の働きを整えたり、目の疲れを改善します。
ピリドキシン塩酸塩	15mg	
タウリン	150mg	眼組織の新陳代謝を整え、目の疲れに効果をあらわします。

添加物として、*l*-メントール、リウノウ、ベンザルコニウム塩化物、塩化Na、塩化K、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、ホウ酸、ホウ酸Naを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるためで、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 添付の携帯袋に入れ、直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中（ダッシュボード等）や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- (7) 本剤は、ピンク色の目薬ですので、衣服につかないように注意してください。もし衣服についたときは、すぐに水で洗い流していただければシミになりません。
- (8) 容器のネジ部に成分の赤い結晶がつくことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどでふき取ってから使用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号