

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

花粉、ハウスダストなどによる
鼻のアレルギー症状（鼻づまり、鼻みず）に

第2類医薬品

ヒストミン点鼻薬DX

アレルギー専用点鼻薬

有効成分の抗アレルギー薬「ケトチフェンフル酸塩」が、「抗アレルギー作用」、「抗ヒスタミン作用」、「抗炎症作用」の3つの作用で花粉やハウスダストなどによるアレルギー症状を改善し、「ナファゾリン塩酸塩」が鼻づまり等をすばやく緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人には使用しないでください
7才未満の小児
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください
(動物試験で乳汁中への移行が認められています。)
4. 長期連用しないでください
(連続して使用する場合は、2週間以上あけてください。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	乾燥感、刺激感、はれ、鼻出血
精神神経系	脱力感、頭痛

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気、口のかわき
4. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法・用量】

1回に1度ずつ、1日4回(朝・昼・夕方及び就寝前)両鼻腔内に噴霧してください。

(1)噴霧でケトチフェンとして0.05mg)また、連続して2週間を超えて使用せず、再び使用する場合は2週間以上あけてください。

年齢	成人(15才以上)及び 7才以上の中の小兒	7才未満
1回量	両鼻腔内に1度ずつ	
使用回数	1日4回 朝・昼・夕方及び就寝前	使用しないこと

使用方法



キャップをとります。



容器をもち、液が噴霧するまで、はね部を2~3回押してください。



静かに息を吸い込みながら、鼻腔内に噴霧してください。

(液が残っている音はするが出ない時)

液を吸い上げるチューブは右図の
ような構造になっています。
緩やかなカーブがついていますので
容器をかたむけず
お使い頂くと、
むだなくお使い
いただけます。



容器断面図

- 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
- 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。
- ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでやめください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量(必ず1日4回)を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【効能】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:

鼻づまり、鼻みす(鼻汁過多)、くしゃみ

【成分・分量】

成 分	分 量(100mL中)	作 用
ケトチフェン フマル酸塩	75.6mg	アレルギーをひきおこす化学物質の放出を抑えることにより、花粉やハウスダストなどによる不快な症状を緩和します。
ナファザリン塩酸塩	25mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。

添加物: グリセリン、ベンザルコニウム塩化物、エタノール、pH調節剤、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

製造販売元

株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地