

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	
製品名	ケロリンT
製品名（読み）	ケロリンT
製品の特徴	非ピリン系解熱鎮痛剤，アセチルサリチル酸，アセトアミノフェンは，温熱中枢及び痛覚中枢に働いて悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛みにすぐれた効果をあらわします。 さらに無水カフェインが脳血管に働いて，頭痛をやわらげます。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 本剤又は他の解熱鎮痛薬，かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 15才未満の小児。 出産予定日12週以内の妊婦。 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬，かぜ薬，鎮静薬 服用前後は飲酒しないでください 長期連用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用前に医師，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください <ol style="list-style-type: none"> 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 授乳中の人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の診断を受けた人。 心臓病，腎臓病，肝臓病，胃・十二指腸潰瘍 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください <p>【関係部位：症状】 皮膚：発疹・発赤，かゆみ，青あざができる 消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振，胸やけ，胃もたれ，腹痛，下痢，血便，胃腸出血 精神神経系：めまい その他：鼻血，歯ぐきの出血，出血が止まりにくい，出血，発熱，のどの痛み，背中の痛み，過度の体温低下</p> <p>まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>【症状の名称：症状】 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。 中毒性表皮壊死融解症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。 急性汎発性発疹性膿疱症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。 <u>薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる，全身性の発疹，発熱，体がだるい，リンパ節（首，わきの下，股の付け根等）のはれ等があらわれる。</u></p>

	<p>間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</p> <p>腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。</p> <p>肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。</p> <p>ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。</p> <p>再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。</p> <p>3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>										
効能・効果	頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱										
効能関連注意											
用法・用量	<p>次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。</p> <p>[年齢：1回量：1日服用回数] 15才以上（大人）：1包：2回 15才未満：服用しないこと</p>										
用法関連注意	(1) 本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。										
成分分量	<p>1包(900mg)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセチルサリチル酸</td> <td>600mg</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>100mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ末</td> <td>60mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセチルサリチル酸	600mg	アセトアミノフェン	100mg	無水カフェイン	60mg	ケイヒ末	60mg
成分	分量										
アセチルサリチル酸	600mg										
アセトアミノフェン	100mg										
無水カフェイン	60mg										
ケイヒ末	60mg										
添加物	バレイシヨデンブ										
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）</p> <p>(4) 配置期限をすぎた製品は服用しないでください。</p>										
消費者相談窓口	<p>会社名：富山めぐみ製薬株式会社 住所：富山県富山市三番町3-10 問い合わせ先：お客様相談窓口 電話：076（421）5531 受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）</p>										
製造販売会社	<p>富山めぐみ製薬（株） 会社名：富山めぐみ製薬株式会社 住所：富山県富山市三番町3-10</p>										
販売会社											
剤形	散剤										
リスク区分等	第「2」類医薬品										