



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

お子さまが簡単に開けられない
安全キャップ採用

せき、たん

鎮咳去痰薬

ムヒのこどもせきどめシロップ[®]sa



販売名：ムヒのこどもせきどめシロップSa

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ムヒのこどもせきどめシロップSaは、せき、たん

特長

- お子さま好みの「イチゴ味」のシロップ剤です。「アンパンマン」のデザインで、小さなお子さまにも飲ませやすいように工夫してあります。
- 3カ月から8才未満のお子さま用として開発したせきどめ薬です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。
3. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

(裏面につづく)

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気。
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

せき、たん

用法・用量

年齢	1回量
5才以上8才未満	10mL
3才以上5才未満	7.5mL
1才以上3才未満	6mL
3カ月以上1才未満	3mL
3カ月未満	服用しないこと



1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、場合により約4時間間隔で1日6回まで服用できます。●添付のカップで量を計り、服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

成分とそのはたらき

有効成分(60mL中)

成分	分量	はたらき
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	20mg	せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	25mg	気管支を広げ呼吸を楽にして、せきをしずめます。
グアイフェネシン	100mg	気道粘膜の分泌機能を高め、たんを出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	アレルギーなどによるせきをしずめます。
ナンテンジツ流エキス (原生薬換算量 340mg)	0.34mL	生薬成分で、せきをしずめます。
キキョウ流エキス (原生薬換算量 150mg)	0.15mL	生薬成分で、せきをしずめ、たんを出しやすくします。
セネガ流エキス (原生薬換算量 150mg)	0.15mL	生薬成分で、たんを出しやすくします。

添加物として白糖、果糖、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、カラメル、香料を含有します。

シロップの色は生薬エキスとカラメルにより、うすい茶色になっています。

本剤にコデイン系成分は配合されていません。

本剤に卵、牛乳由来の成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 添付のカップは使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
- シロップが固まる場合がありますので、服用のつど、ボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかり閉めてください。
- 使用期限(ケース底面及びボトルに西暦年と月を記載)をすぎた製品は服用しないでください。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振ってから服用してください。

安全キャップの使用方法は、ケース側面及びボトルに記載してあります。別の開け方として、ボトルを平らな所に置き、キャップを上から手で押しながらボトルのほうを時計回りにまわしても開けられます。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

発売元 **MUHI** 株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

製造 **SK** 日新製薬株式会社
販売元 滋賀県甲賀市水口町宮の森2-62