

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



点鼻薬

アレルギー専用

# ザジテン<sup>®</sup>AL 鼻炎スプレーαクール

Zaditen<sup>®</sup>

第2類  
医薬品

## 特徴

花粉・ハウスタストなどによるくしゃみ・鼻みず・鼻づまりに

- ザジテンAL鼻炎スプレーαクールは、3つのはたらきをもつ抗アレルギー薬「ケトチフェンフル酸塩」を配合した「アレルギー専用点鼻薬」です。
- アレルギーの「発症」から「悪化」までのメカニズムに作用し、軽い症状を感じたときから、アレルギーをコントロールすることができます。
- 液だれしにくい高粘度の薬液が鼻の奥まで広く密着し、長くとどまるため、成分が効果的に浸透します。
- どの角度（横向き・逆さ）でも噴霧が可能な、エアレス容器を採用しています。
- l-メントール（添加物：清涼化剤）配合で、スキッとした使い心地です。

### ケトチフェンフル酸塩のはたらき

抑える + 鎮める + ひどくしない  
トリプル・コントロール

抑える

抗アレルギー作用

鎮める

抗ヒスタミン作用

ひどくしない

抗炎症作用

アレルギー  
アレルギー症状を引き起こす誘発物質が体内に放出されないように元から抑えます。

ヒスタミン受容体をブロックし、既に起つてしまふたアレルギー症状を鎮めます。

粘膜の炎症を改善し、症状が繰り返し起こりにくい状態を保ちます。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- 次の人には使用しないでください。  
7才未満の小児
- 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）
- 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。  
(動物試験で乳汁中への移行が認められています。)



### 相談すること

- 次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
- 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
- 妊娠又は妊娠していると思われる人
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
鼻	乾燥感、刺激感
精神神経系	脱力感、頭痛

- 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
眠気

- 1週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 次の場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり

## 用法・用量

1回に1度ずつ、1日4回(朝・昼・夕方及び就寝前)両鼻腔内に噴霧してください。(1噴霧でケトチフェンとして0.05mg)


年令	成人(15才以上)及び 7才以上の小児	7才未満
1回量	両鼻腔内に1度ずつ	使用しないこと
使用回数	1日4回 朝・昼・夕方及び就寝前	

### <用法・用量に関する注意>

- 花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。
- 定められた用法・用量(必ず1日4回)を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 点鼻用にのみ使用してください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

### <使い方>

初めてご使用の際は、容器の構造上薬液が霧状になりにくいで、薬液が霧状になるまで5回程度押してください。  
※薬液が霧状に出れば投与準備は完了です。



どの角度(横向き、逆さ)でも噴霧可能なエアレス容器を使用しています。

※ノズルの先端を針等で突くのは、折れたとき大変危険ですのでおやめください。

## 成 分

### 100mL中

ケトチフェンフル酸塩 75.6mg

添加物: L-メントール、カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、ベンザルコニウム塩化物、グリセリン、エデト酸ナトリウム、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

## 【お問い合わせ先】

(1) 購入した薬局・薬店

(2) グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

お客様相談室

【電話】0120-099-301

【受付時間】9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

(3) 上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。

連絡先: 公益財団法人 日本中毒情報センター 中毒110番

電話: 072-727-2499(24時間、365日対応)

ザジテン製品に関する情報はこちら <http://www.zaditen-al.jp>

製造販売元

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1