

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

## 鼻炎用薬 コフチールこども鼻炎シロップS

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどはかぜの初期や気候の変わり目のほか、花粉や室内のほこりなどが原因となるアレルギー性鼻炎の時に起こります。

コフチールこども鼻炎シロップSは、鼻みずやなみだの過剰な分泌をおさえる「ペラドンナアルカロイド」やアレルギー症状をおさえる抗ヒスタミン剤「*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩」などの成分を配合し、小さなお子様の不快な症状を緩和する、甘くて飲みやすいストロベリー味のシロップ剤です。



### 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)高齢者。  
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(7)次の診断を受けた人。  
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【効能・効果】**

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

**【用法・用量】**

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び必要に応じて、就寝前に服用してください。また、1日6回まで服用しても支障ありませんが、その場合には約4時間の間隔を置いて服用してください。

年 齢	1回量
3歳以上7歳未満	5 mL
1歳以上3歳未満	3.5 mL
6ヵ月以上1歳未満	3 mL
3ヵ月以上6ヵ月未満	2.5 mL
3ヵ月未満	服用しないでください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

**【成分・分量と作用】**

1日量(30mL)中

成 分	分量	作 用
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg	抗ヒスタミン剤で、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	35mg	鼻づまりを緩和します。
ベラドンナアルカロイド	0.15mg	鼻みずや涙がひんぱんに出るのをおさえます。
グリチルリチン酸二カリウム	33mg	鼻粘膜の炎症をおさえ鼻づまりをしずめます。

添加物として、白糖、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、香料、グリセリン脂肪酸エステルを含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつど、ピンの口をよく拭き、フタをしっかりしめておいてください。
- (6)いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7)添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824  
T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**福地製薬株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824