

**神経痛・腰痛・関節痛に
解熱鎮痛薬 新カツロS**

第2類医薬品

新カツロSは、鎮痛効果のある和漢洋薬の両方を配合した、神経痛・腰痛・関節痛などによく効く薬です。昔から痛みによく用いられている生薬のシャクヤクとカンゾウに、鎮痛・消炎作用のあるボタンビを配合しており、洋薬として、解熱・鎮痛作用を有するアセトアミノフェンとエテンザミドを配合し、効果を高めています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 - 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 - (眼気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあります。空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合

◆効能・効果

- 1)神経痛・腰痛・関節痛・肩こり痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2)悪寒・発熱時の解熱

◆用法・用量

15歳以上 1回 4錠

1日 2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。

服用間隔は 6時間以上おいてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)本剤は、15歳未満の小児は服用しないでください。

(3)錠剤の取り出し方（PTP包装の場合）

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



◆成分・分量と作用

1日量（8錠）中

成 分	分量	作 用
アセトアミノフェン	600mg	鎮痛・解熱薬。痛みの中枢に働き、神経痛・腰痛・関節痛などの痛みを鎮めます。
エテンザミド	900mg	持続性のある鎮痛・解熱効果を示します。
アリルイソプロピル アセチル尿素	120mg	鎮静剤で鎮痛・解熱成分との相乗効果が期待できます。
無水カフェイン	100mg	血液の流れを良くし、他の配合成分の効力を高める働きをします。
ボタンビ末	200mg	ボタンの根皮で、主成分であるペオノールが、すぐれた鎮痛・消炎作用をあらわします。
シャクヤク末	200mg	シャクヤクの根で、主成分であるペオニフロリンが、すぐれた鎮痛作用をあらわします。
カンゾウ末	152mg	甘草の根で、主成分であるグリチルリチンが、いろいろな痛みを緩和します。

添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、パレイショデンブンを含有します。

◆保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に（瓶包装の場合は密栓して）保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻 824