

第②類医薬品

非ピリン系

肩こり痛

解熱鎮痛薬

いたみ

サリゲンS



製造販売元

和平製薬株式会社

奈良県葛城市弁之庄380番地1

TEL 0745(69)2006

## 効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

## 用法・用量

- 15歳以上 ..... 1回 1包  
11歳以上15歳未満 ..... 1回 2/3包  
8歳以上11歳未満 ..... 1回 1/2包  
何れも1日1回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。

## 用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用して下さい。
- (2)用法及び用量を厳守して下さい。
- (3)8歳未満の小児には服用させないで下さい。

**2包入(1包1g) ¥200**

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

配置  
期限



きりくち 

## 成分・分量 1包(1g)中

エテンザミド	380mg
アセトアミノフェン	200mg
プロモバレリル尿素	200mg
無水カフェイン	80mg

添加物として、緑茶末、銅クロロフィリンナトリウム、バレিশヨデンブ、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

## 注意

1. 次の人は服用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
5. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
6. 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
7. まれに、固まることがありますので、振ってお飲み下さい。

# ⚠ 使用上の注意 **サリゲンス** 第②類医薬品

## ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気等があらわれることがある)
4. 服用前後は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下



まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性顔発疹発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等が見られ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- まれに、固まることがありますので、振ってお飲み下さい。