

クスリ早見帖2016年版

新製品データ 2016年5月27日更新

要指導医薬品 枠色：紫
第1類医薬品 枠色：橙
指定第2類医薬品 枠色：青
第2類医薬品 枠色：緑

[お問合せ先]
株式会社プラメドプラス
E-mail: info@plamedplus.co.jp

クスリ早見帖2016年版をお持ちの方へ

きれいに印刷して、
ピッタリサイズの「MEMO欄」等に
に切り貼りして、ご利用ください。
新製品の医薬品成分特定に役立ちます！

解熱鎮痛薬 イブクイック[®] 頭痛薬DX

用法 15歳以上1回2錠、1日2回を限度になるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は6時間以上。

成分 2錠中 [15歳以上の1回量に相当]
イブプロフェン 200mg
酸化マグネシウム 100mg
アシルイソプロピルアセチル尿素 60mg
無水カフェイン 80mg



エスエス製薬株式会社

解熱鎮痛薬 バファリンEX

用法 15歳以上1回1錠、1日2回まで。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。服用間隔は4時間以上。なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として60mg)
乾燥水酸化アルミニウムゲル 120mg



ライオン株式会社

解熱鎮痛薬 ロキソニン[®] Sプレミアム

用法 15歳以上1回2錠、1日2回まで。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。服用間隔は4時間以上。なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。

成分 2錠中 [15歳以上の1回量に相当]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として60mg)
アシルイソプロピルアセチル尿素 60mg
無水カフェイン 50mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 100mg



第一三共ヘルスケア株式会社